

GALEB



- Galebi (znanstveno Laridae) so ptice iz reda pobrežnikov (*Charadriiformes*) in so v bližnjem sorodstvu s čigrami. So robustni ptiči s plavalnimi nogami, dolgimi koničastimi perutnicami, močnim, kljukastim kljunom, rep pa je navadno ravno odrezan. Barve so v glavnem bele, sive in črne. Spola sta enaka, pri mladičih prevladuje rjava barva. Mladiči velikih vrst se popolno prebarvajo šele po nekaj letih in dobijo perje odraslih. Gnezdijo kolonijsko. Znesejo 2 ali 3 jajca.

PREHRANA

- Ribe
- Žuželke
- Organski ostanki

RAZMNOŽEVANJE

- Jate
- 2-4 jajca
- Valitev 3-4 tedni
- Gnezdijo kolonijsko

VRSTE

- Znanih 40 vrst
- Največji srebrno sivi galeb
- Nekateri živijo ob morjih, nekateri pri rekah









ČIGRA



- Čigre se hranijo z različnimi živalmi. Njihova glavna hrana so ribe. Ko iz zraka zagledajo plen v morju, se spustijo na vodno površino in ga zgrabijo z kljunom. Perje redno mastijo z maščobo iz trtične žleze v repu. Ob stiku z vodo se ne zmočijo, zato brez težav vzletijo z vodne površine. Odrinejo se z močnimi nogami s plavalno kožico med prsti. Čigre preletijo velike razdalje ko se selijo.

PREHRANA

- RIBE

NARAVNI SOVRAŽNIKI

- Vrana(izropa gnezdo)
- Lisica(izropa gnezdo)
- Rečni galeb(tekmec za valitveni prostor)

RAZMNOŽEVANJE

Znese 2-3 jajca

- Jajca so rumenkasta do olivno rjava, sivo do črno lisasta
- velikost 41 x 31 mm
- Jajca se valijo 21-22 dni

VRSTE

- Navadna čigra
- Mala čigra
- Črna čigra
- Kričava čigra
- Beloperuta čigra
- Belolična čigra









KORMORAN



- Kormoran je ptič iz družine kormoranov, ki gnezdi po večjem delu starega sveta in na vzhodnih obalah Severne Amerike.
- Zraste lahko do 90 cm in lahko doseže težo 2 kg
- Pod krili ima manj zraka kot drugi ptiči zato lahko zasleduje ribe pod vodo

PREHRANA

- Ribe

RAZMNOŽEVANJE

- Znese 5-6 jajc
- Velikost jajca 57x36mm
- Valitvena doba je 26 dni

VRSTE

- Pritlikavi kormoran
- Veliki kormoran
- Vranjek







