

# Klopni meningitis



Dijakinja:  
Razred:  
Mentor:

# Kaj je klopni meningitis?


- je virusno vnetje možganskih ovojnic, ki se pojavi 2 do 3 tedne po ugrizu okuženega klop



- V Sloveniji je najbolj razširjena vrsta klopa *Ixodes ricinus*, katerega ugriz lahko povzroči predvsem dve bolezni: meningoencefalitis in Lyme



- Habitat klopov je v travi, v grmovju (predvsem leska) in v podrasti vlažnih mešanih gozdov, aktivni pa so od pomladi do jeseni.
- Največ okuženih klopov je na Koroškem, osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.



# Simptomi in znaki

- Med okužbo (vbodom klopa) in izbruhom bolezni mine od 7 do 14 dni.
- Pri bolniku se pojavijo neznačilni bolezenski znaki, ki so podobni gripi.
- Po prostem obdobju, ki traja do 20 dni in v katerem se bolnik dobro počuti, se pojavijo znaki prizadetosti različnih struktur osrednjega živčevja.



gitis so značilni:  
na temperatura,



# Zdravljenje

- Bolnika sprejmemo v bolnišnico, mu lajšamo simptome z zdravili proti vročini in bolečinam ter skrbimo za zadostno uživanje tekočin.
- Bolniki večinoma ozdravijo brez posledic, pri nekaterih pa so tudi čez nekaj mesecev še prisotne težave, najpogosteje glavobol, utrujenost in motnje koncentracije.

# Preprečevanje

- Za preprečevanje okužbe veljajo vsi ukrepi za zaščito pred vbodi klopa – cepljenje
- Cepljenje se priporoča vsem po dopolnjenem enem letu starosti, ki živijo ali obiskujejo območja, kjer se boleze pojavljajo, in v posebnih potrebnih primerih.



CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGITISU



Hvala za  
pozornost □

