

KOPITARJI IN DIVJA SVINJA

BIOLOGIJA



Pivodni konj (*Hippopotamus amphibius*)



Rdeči jelen (*Cervus elaphus*)




Zebu kova

Delitev kopitarjev



SODOPRSTI KOPITARJI



LIHOPRSTI
KOPITARJI



Kopitarji

Kopitarje predstavljata dva samostojna redova, za njih so značilna kopita. Delimo jih na sodoprste in lihoprste kopitarje. Pri obeh redovih je zadnji členek tretjega prsta sploščen, prekrit z roževinastim tkivom, ki tvori kopito. Kopitarji so zelo raznolika skupina, povečini so rastlinojedci, nekatere skupine so vsejede (svinje). Pogosto se združujejo v velike črede, kjer so mladiči bolj na varnem pred plenilci. Nekatere vrste imajo povečane podočnike v čekane, kar jim omogoča boljšo obrambo pred napadalci, pa tudi pri iskanju hrane v tleh. Mnoge vrste imajo na glavi rogove, ki so votli roževinasti enostavni izrastki (kot pri govedu) ali koščeni razvejani izrastki (kot pri jelenih). Mnogo kopitarjev je človek uspešno udomačil in ustvaril številne sorte. Večina zoologov je mnenja, da so kopitarji poleg primatov najuspešnejša skupina sesalcev, ki je dejansko dosegla svoj evolucijski vrhunec. Med sodoprste kopitarje spadajo svinje, povodni konji, kamele, jeleni, žirafe, vilorogi in votlorogi kamor sodijo antilope, goveda, ovce in koze. Med lihoprste kopitarje uvrščamo konje, tapirje in nosoroge.



Sodoprsti kopitarji ali parkljarji:

- Končni členi prstov so zaščiteni s kopitom
- Noge so prilagojene za tek
- Manjka jim prvi prst, drugi in peti sta zakrnela, preostala dva sta dobro razvita



Lihoprsti kopitarji :

- Dobro razvit tretji prst
- Preostali so slabo razviti ali pa jih sploh ni
- Končni prsti so



Divja Svinja



Uvrščanje

KRALESTVO:živali

DEBLO:strunarji

PODDEBLO:vretenčarji

RAZRED:sesalci

RED:sodoprsti kopitarji

DRUŽINA:svinje

VRSTA:divje
svinje



Divja Svinja

- Je največja predstavnica divjih sesalcev v Evropi
- Je divja sorodnica prašiča
- Tu in tam si privošči kopel v blatu, s tem se osveži in znebi zajedavcev
- Na koncu gobca ima rilec, s katerim brska po zemlji in išče hrano
- Včasih na dan prehodi do 50 km, zato da pride do hrane, da zbeži plenilcu ali da poišče ugodnejše podnebne razmere.
- Če škrtja z zobmi, pomeni da se pripravlja za napad
- Ima dobro razvite podočnike, ki štrlijo navzgor, podočniki na zgornji čeljusti pa se podaljšajo v dva okla



Deli telesa

Dolga je do 1,10-1,80 m, njihov rep pa je dolg 20-30 cm. Težke so lahko od 50-180 kg , redkeje pa dosežejo težo 250 kg. Imajo masivno telo z klinasto glavo, manjša stoječa ušesa, odrasle živali pa imajo še velike čekane. So okrasto do črnorjave barve in imajo ščetinasto dlako, pozimi pa jim zraste še gosta poddlaka.



- 
- **VELIKOST IN TEŽA:** Povprečna dolžina odraslega samca je 1,70 m, teža pa 150 kg, lahko pa tehta tudi do 300 kg
 - **ŽIVLJENJSKA DOBA:** Živi okoli 20 let
 - **PREHRANJEVANJE:** je vsejed, hrani se z želodi, kostanji, semeni, krompirjem, pa tudi s poljskimi mišmi in podganami
 - **NARAVNI SOVRAŽNIK:** je plen volkov in medvedov
 - **DRUŽLJIVOST:** živi v tropu ,ki šteje okoli ducat družinskih članov. Glavna je samica, odrasli samci (merjasci) pa trop varujejo pred sovražniki
 - **GLAS:** godrnja in spušča nosljajoče glasove
 - **RAZŠIRJENOST IN NARAVNO OKOLJE:** prebiva v gozdnatih pokrajinah v Evropi in Aziji

Razmnoževanje



- **PARJENJE:** pariyo se novembra in decembra
- **BREJOST:** traja približno 3 mesece
- **ŠTEVILO MLADIČEV:** samica skoti od 2 do 12 mladičkov, ki imajo do šestega meseca starosti progast kožušček, ko sesajo pri materi vsak uporablja vedno isti sesek

