

SPLAV

Umetni splav ali **umetna prekinitev nosečnosti** je medicinski poseg, ki se opravi na zahtevo nosečnice. Najpogostejša metoda za prekinitev nosečnosti v prvih dvanajstih tednih sta razširitev (dilatacija) materničnega vratu in izpraskanje ali posrkanje vsebine (abrazija ali vakuumska aspiracija) iz maternične votline.

Po trinajstem tednu se dokonča nosečnost tako, da se sprožijo popadki s solno raztopino ali s prostaglandini. Bolj poredko pa se opravlja mali carski rez.

Pri umetnem splavu ostaja moralno vprašanje, kjer so mnenja deljena: ali zarodek je oseba ali ni.

V Sloveniji število splavov strmo pada, vendar pri šestnajstletnicah in mlajših beležijo v letu 2004 celo skoraj za četrtno več primerov kot leto poprej. Leta 2004 se je v Sloveniji opravilo 6403 splave, torej enega na uro in dvajset minut.

Kdaj govorimo o spontanem splavu?

O spontanem splavu govorimo takrat, ko je nosečnost spontano prekinjena pred 20. tednom nosečnosti. Največ spontanih splavov nastopi med 2. ali 3. mesecem nosečnosti

1. **GROZEČI SPLAV**
2. **NEDOKONČANI SPONTANI SPLAV**
3. **DOKONČANI SPONTANI SPLAV**
4. **SEPTIČNI SPLAV**
5. **HABITUALNI SPONTANI SPLAV**

Resnica in umetna prekinitev nosečnosti je popolnoma drugačna, kakor vam to predstavljajo, ne da se drugače reči, temne sile. Dejstvo je, da splav prinaša neznansko trpljenje tisti, ki ga je opravila.

Rak na dojki je povišan do 800%! Pri določeni skupini, ki so naredile splav pred 18 letom, ga dobi prav vsaka!

Tukaj je bridka resnica, ki pokaže, milo rečeno, zlo prve vrste!

Najtežje pa je to, da je pri tem zločinu nad njenim otrokom in sabo, ženska prostovoljno prisiljena v sodelovanje. Zato je tiho! Saj se je sama odločila. Odločitev je bila njena.

Vendar je ženska v trpljenju sama in nobeden, skoraj prav nobeden, ne vidi ali noče videti njenega izjemno hudega trpljenja. Samo tihe, nevidne, solze strašne bolečine, tečejo po neutolažljivi duši!

Splav, opravljen strokovno, v higienskih pogojih in "ne pušča posledic, morebitne travme se da odpraviti". **TO JE PATOLOŠKA LAŽ!!!**

Znanstveniki so naredili poizkus, ki bi enkrat za vselej odgovoril ali je občutek za pravičnost prirojen ali je priučen.

Eni skupini opicam so dali, da izvršijo nalogo. Za pravilno izvršeno nalogo so bile nagrajene s hrano. Drugi skupini opic pa niso dali naloge, niti nagrade. To se je ponavljalo toliko časa, da so opice hitro in vestno opravile nalogo, ker so vedele, da bo določeni nalogi sledila nagrada.

Potem so pa znanstveniki malo spremenili nagrajevanje. Skupini opic, ki je uspešno opravila nalogo, niso dali nagrade, ampak so dali nagrado drugi skupini opic, ki ni počela ničesar ali naloge ni uspešno opravila.

V skupini, ki je uspešno opravila nalogo in ni dobila nagrade, je nastal strašen revolt in pojavilo se je tudi nasilno vedenje.

Zdelo se jim je nepravilno, da za uspešno delo niso dobile nagrade, medtem, ko so druge, ki so bile neuspešne ali niso počele nič, dobile nagrado.

S tem so znanstveniki dokazali, da je občutek za pravičnost prirojen!

Če človek ne naredi prav, kar mu vелеva notranji čut in ustrojstvo, **se pojavi vest!**

Vsak je že imel moralnega mačka in dobro ve kako je to. V hujših primerih, kot je vzeti človeško življenje, se vest oglašča čedalje močnejše in ne preneha.

Saj poznate tisto, ko se storilec zločina sam prijavi! Ko storilec zločina prizna, da si olajša vest! V tem primeru, tudi rade volje sprejme kazen, ki sledi temu. Vendar je vzetje človeškega življenja nepovraten proces! In to se zaveda vsak storilec. Nekateri za sebe zahtevajo tudi smrtno kazen. Da je pravičnosti zadoščeno!

Torej, vest se pojavi takrat, ko se zaveš da nekomu nekaj ne storiš prav. Ali sebi ali drugemu! Ni nujno, da se pojavi takoj. Vendar se pojavi! In ko se pojavi, začne postajati ZELO HUDO!

Glas vesti vesti traja toliko časa, dokler ne poravnáš storjene krivice. V primerih, ko ne moreš več poravnati storjene krivice, se vest oglašča čedalje močnejše in ne mine! V tem primeru se prej ali slej se pojavijo poizkusi samokaznovanja(znižanje svoje vrednosti), da nekako zadostiš pravici!

Najtežje pa je, ko se zavedaš, **da si umorila svojega otroka! Ne drugega, ampak svojega!** In v veliko primerih, to zadene tudi moškega!

Ubiti otroka, kaj šele lastnega, je najtežja oblika zlo dela in tega se zavedaš! Nekaj si storila proti svoji zavestni ali podzavestni želji! Ta želja pa je, čimbolj biti uspešna v širitvi SVOJIH genov! To je nadaljevanje tvojega življenja kot matere!

**Tukaj so postopki, kako se strokovno opravlja splav v sterilnem in higieničnem okolju!
Potek in vrsta splava.**

Abortivna tabletk RU-486 (Mifepristone, Mifeprex)

Uporabi se v začetni fazi nosečnosti, tudi ko otroku že utripa srček. Ni več učinkovita po petih do sedmih tednih nosečnosti! Vedno poškoduje otroka. Posledica uporabe abortivne tabletk je blokada bistvenih hormonskih sestavin, da se komaj spočeti otrok izstrada do smrti in ne ugnezdi v maternico. Ženska krvavi več dni, tudi več kot 30.

Veliko reklamo v svetu, zapostopek splava z RU 486, so naredile skupine za "možnost izbire", za "ženske pravice"...

"Tabletka po", "Enostavna rešitev", ...

Tukaj se pojavi vprašanje kdofinancira te skupine?

Abortivna tabletk potencialno povzroča posledice na plodnost in imunski sistem.

Pri ženski je velika možnost, da nastanejo poškodbe na jetrih, motnje v delovanju ledvic z odpovedjo, motnje v delovanju srca, upad kostnega mozga, motnje v prebavnem sistemu, razne okužbe, motnje v delovanju pljuč s pljučnico ter **smrt**.

Poškoduje psiho, ko ženske vidijo, kak je videti njihov otrok, ki ga je izstradala do smrti. Prav tako, ko se zave, kaj je storila.

Poročajo pa tudi o infarktih, kapeh, motnjah v govoru... **neposredno so dokazane smrti žensk, ki so nastale zaradi uporabe abortivne tabletk.**

Spomnite se kako hitro so 2004 v Sloveniji iz prodaje vzeli tablete za hujšanje Reductil, ker se je pojavil sum, da je njihova uporaba v svetu povzročila smrt nekaj žensk, ki so jih jemale!

Kemijski splavi ne izboljšujejo ženskega zdravja, so le novi način za ubijanje otrok in mučenja žensk.

Menstruacijska ekstrakcija

Zelo zgođen splav s sukcijo(posrkanjem), preden je test za nosečnost pozitiven.

Sukcija (posrkanje) *Za nekatere tudi praskanje*

Oseba, ki dela ženski splav, sprva ohromi maternični vrat. Potem vstavi cannulo (sesalno cev), ki ima podobno konico kot nož, v maternico. Sesalna cev ima moč srkanja, ki je 27 do 29 krat močnejša kot vakuum pri sesalcih za prah.

S srkanjem raztrga posteljico in otroka v kose, ki gredo skozi cev v zbiralni kozarec. Nazadnje s kireto počisti – postrga - spraska (ali pa tudi ne) morebitne ostanke otroka in ali posteljice v maternici.

Razširitev in Razrez - Dilatation & Curettage (D&C)

Danes neobičajen postopek uporabljan v prvih 10 tednov nosečnosti. Ta postopek je podoben sukaciji, s to razliko, da oseba, ki opravlja splav, razširi maternični vrat in s kireto razreže posteljico in otroka v kose, ki jih potem ob močni krvavitvi, postrga ven.

D & X (splav z delnim rojstvom)

Ko so v ZDA sprejeli zakon, ki prepoveduje ta splav, so se razni borci in borke za »človekove pravice«(beri častilci smrti) vzdignili, da prepoved tega splava povzroča razne družinske tragedije in da je "to korak nazaj v uresničevanju človekovih pravic!"

Histerotomija ali zgodnji carski rez

Ta splav se uporablja v pozni nosečnosti. Postopek je isti kot pri izvedbi carskega reza. Razlika je v tem, da se opravi carski rez, da bi otrok in ali mati preživel. Pri tem postopku pa je namen otroka umoriti. Umor se opravi s prekinitvijo dotoka kisika v otroka skozi popkovino ali utopitvijo.

Zastrupitev s soljo (kandirana pečena jabolka)

Ta oblika splava je pogosto uporabljana po prvem trimestru. Oseba, ki opravlja splav vbrizga močno slano raztopino v amniotsko vrečko.

Otrok se obnaša tako, kot so se obnašale žrtve zastrupljene z bojnimi plini. Davljenje, kriljenje z okončinami, izločanje. Včasih otrok ta postopek preživi. Otroka se odstrani iz maternice po dnevu do dveh.

Zakaj »kandirana pečena jabolka«? Zato ker je otrokova glava in tudi telo po tem postopku pogosto podobna kandiranemu pečenemu jabolku. Korozivna posledica tega splava je, da odstopijo zunanji deli kože in se pokaže surovo svetleči del kože ali tkiva.

Poškodbe kožnega tkiva so kot pri uporabi napalma. (Napalm je lahko vnetljiva mešanica snovi, ki se uporablja za sežiganje nasprotnikove žive sile. Pri tem se razvije temperatura, ki je dvakrat višja, kot je potrebna za taljenje jekla)

Splav s Prostaglandinom (Misoprostol)

Obstajajo tri oblike. Pri dveh se Prostaglandin vbrizga, pri enem se vstavi svečko s Prostaglandin v nožnico. Izvaja se v drugem trimestru nosečnosti. Hormon povzroči nasilne

popadke, kar privede do prezgodnjega poroda. Če je otrok dovolj star, velikokrat preživi travmo, razen če je premajhen, da bi samostojno živel.

Če preživi, si lahko predstavljate, kaj naredijo z njim.

Splav z Methotrexate

Uporablja se pri 5 do 9 tednih. Injekcija prepreči delitev celic. Po več dneh, ko je otrok že mrtev, se ženski vstavi svečko s Prostaglandinom, da sproži popadke. Ženska ponavadi splavi doma. Zahteva najmanj tri obiske pri zdravniku zaradi možnih komplikacij ali dokončanja procesa.

Splav z Digoxinom

Uporablja se med 20 in 32 tednom. Vbrizga se ga naravnost v otrokovo srce, kar pripelje do infarkta! Povzroča burno reakcijo otroka, ki se zvija v bolečinah. Ko se umiri, je mrtev. S Prostaglandinom se dokonča postopek.

Kot ironija je napisano opozorilo, da Digoxin ubije otroka in poškoduje žensko psiho. **Kot, da drugi splavi ne!** Ker pa je otrok v maternici že sorazmerno velik, splavnica dobro čuti, kako se njen otrok bori za življenje! Kdo pravi, da ženske niso prostovoljno prisiljene?

Vsako življenje se vedno bori za svoj obstanek! In življenje se začne s spočetjem!

Zaključek

PREDNOSTI

Zakonita možnost pri neučinkoviti kontracepciji, vendar to ni kontracepcijska metoda.

POMANJKLJIVOSTI

Splav je za nekatere ženske nesprejemljiv. Hkrati je obremenjujoč, saj sta potrebna 2 do 4 obiski v ordinaciji. Ženske so bolj čustveno obremenjene.

TVEGANJE

Zelo majhno je, če traja nosečnost 6 do 8 tednov (vakuumaska tehnika, abortivna tabletki). Če traja nosečnost dlje, se tveganje poveča.

TVEGANJE ZANOSITVE

Postopek prekine nosečnost.

Takojšnje in kasnejše posledice so zelo redke.

VZROKI ZA NEUČINKOVITOST

Nepopoln poseg. Nepravilnosti maternice. Zunajmaternična nosečnost.