

SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI



SIFILIS

Treponema pallidum povzroča spolno bolezen Sifilis. Do okužbe pride ob spolnem stiku. Otrok okužene matere se rodi z okvarami, ker se treponema prenese preko posteljice. Mogoč pa bi bil tudi prenos s transfuzijo, če ne bi bilo nadzora. Zdr. osebje se lahko okuži tudi ob dotiku kužnih sprememb pri preiskavi ali negi bolnika (nastane okužba na prstih).

Znaki: 1. stadij - nastane trdi čankar, 2. stadij - izpuščaji. 3. stadij - ponavadi bolnik ni več kužen. Tedaj nastanejo kronična vnetja z razpadom tkiva.




SIFILIS



GONOREJA

Neisseria gonorrhoeae povzroča najpogostejšo spolno bolezen gonorejo ali kapavico. Najpogostejša je pri mladih od 15-30 let. Novorojenček se okuži od matere pri porodu. Gonorejo najpogostejše razširjata okuženi moški in ženska brez znakov bolezni. Gonokok (bakterija) povzroča vnetje sečnice, nožnice, rodil, pri novorojenčkih gonokokno vnetje očesne veznice. Okužba sečnice je pri moških lahko brez znakov, ženska pa dobi gnojno vnetje sečnice in spolovil z gnojnim izcedkom.




CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Je po Gramu neg., zelo drobna bakterija, ki je znotraj celični zajedavec. Pri spolno dejavnih osebah povzroča negonokokno vnetje sečnice ter vnetja rodil. Je najpogostejši dejavnik neplodnosti. Edini nosilec te bak. je človek. Prikrita okužba lahko pri materi prizadane plod in novorojenčka. Nekateri tipi Chlamydie trachomatis velikokrat povzročijo slepoto (z rokami si prenesemo). Sedaj je zaradi načrtnega zdravljenja obolelih in dviga higienske in življenjske ravni redka. Pojavlja se le v higiensko zapuščenih področjih (Azija, Afrika, Mediterana).



CHLAMYDA TRACHOMATIS:







HIV

Humani virus imunske pomanjkljivosti povzroča AIDS. Oseba ki se je okužila, ostane okužena vse življenje. Sčasoma veliko št. okuženih ljudi zboli in umre od različnih okužb, ker je HIV okvaril imunski sistem. Virus je prisoten v krvi, semenski tekočini in izločkih nožnice ter tudi v slini in materinem mleku. Prenaša se praviloma s spolnim odnosom, homo- in heteroseksualnim odnosom in s prostitucijo ter od obolele matere na otroka ob porodu. Še drugi načini prenosa: z okuženo krvjo, presadkih v zdravstvu, vbodih, urezninah, s krvjo onesnaženimi britvami, tudi človeški ugriz.

HIV je enovijačni virus RNK z ovojnico. Poznamo dva tipa, ki povzročata AIDS pri človeku, HIV 1 (pogosto) in HIV 2 (v Evropi redko). Pri vstopu HIV v telo nastane prehodna vročina, povečanje bezgavk, vnetje žrela in osip. V krvi je velika količina virusa. Protitelesa se začnejo tvoriti po nekaj tednih-mesecih. Nato je človek navidez zdrav (virus se medtem še naprej razmnožuje...).



HIV:



TRICHOMONAS VAGINALIS

Je pražival hruškaste oblike, bičkar, ki povzroča vnetja sečnice in nožnice. Sluznica nožnice je vnetja in prekrita z rumenkastim izcedkom. Navadno se prenaša pri spolnem odnosu. Moški velikokrat nimajo znakov bolezni, jo pa prenašajo. Parazit je razširjen po vsem svetu, prenaša se lahko tudi z vlažnimi onesnaženimi brisačami, predmeti, ginekološkimi instrumenti.



TRICHOMONAS VAGINALIS:

