

BIOKLIMATSKI VIŠINSKI PASOVI

-dna kotlin, dolin in kraških polj: območje inverzije, prizadeto območje ob pozebah; ne uspevajo vse kmetijske kulture, ki običajno uspevajo na teh nadmorskih višinah (**ne uspevata vinska trta in sadno drevje**; slabo uspevajo tudi nekatere vrste žit)

-topli ali termalni pas: začenja se nad dnom kotline (10-20 m) in sega do **300/400m**;

uspevajo vse kmetijske rastline; je toplejši; v ta pas spadajo tudi vsa grčevja, vinorodna območja, zaledje Koprškega primorja; gosta agrarna poseljenost; **NAJBOLJ** ugoden

-hribski pas: do 850-950 m; temperatura je nižja, ne uspevajo več toploljubne rastline, uspevajo pa še ostale vrste (**žita okopavine**); pojavlja se **živinoreja** (osojna stran so pašniki, travniki); še vedno strnjena agrarna poselitve, **poljedelstvo**

-nižji gorski pas: od 850 do 1250/1300m; premrzlo za kmetijstvo, **živinoreja in gozdarstvo**; zaselki (3-10 kmetij), samotne kmetije; veliko **iglavcev**

-višji gorski pas: od 1200 do 1550/1650 m; gozdna meja; travniki, **slabši pašniki**, gozdarstvo; Malo stalne poselitve; ni agrarne poselitve; zelo kratka vegetacijska doba

-subalpski pas: od 1600 do 2000 m, do zg.gozdne meje; **nesklenjen gozd** (smreka macesen **iglasti**), vmes se pojavlja ruševje; planinsko pašništvo; šibko gozdarsko izkoriščanje

-alpski pas: nad 2000m; **nesklenjo rastje** (ruševje), kmetijske **rabe ni**, so posamična pritik.dr.