

	območje:	rastlinstvo:	prst:	značilnosti:
MONSUNSKO PODNEBJE:	Indijska polcelina, del obalne Kitajske	monsunski gozd- bambus, lovorolistr ni gozd-evkaliptus	(slabe), rdečkasto rumene	poletni monsoni, redne poplave, namakanje
EKVATORIALNO PODNEBJE:	Filipinsko otočje, Indonezija, Šrilanka	tropski deževni gozd... sekundarni	(slabe) rdečkasto rumene	30°C, enakomerne letne padavine
SAVANSKO P.:	Indukina	savane, visoka trava		
POLSUHO in SUHO PODNEBJE:	J Sibirija, Mongolija (Gobi)/ Arabski polotok	šopasta trava, stepa, visokotravnata, nizkotravnata stepa	črnozjom / (slaba) rdečkasta puščavska prst	za gorskimi pregradami
SREDOZEMSKO PODNEBJE:	ob Sredozemskim morjem	cedra, grmičevje, živinoreja	(slabe) rdeče, rjave mediteranske prsti	
CELINSKO PODNEBJE:	srednja Azija	mešani gozd, stepsko rastlinstvo (notranj.)	(dobre) rjave in (slabe) kostanjeve	ni veliko dežja
OCEANSKO PODNEBJE:	zmernotopli pas (Japonska)		rjave prsti	enakomerne padavine, T nihanja
VLAŽNO KONTINENTALNO	Peking		rjave prsti	poletni monsoni, konvekc.

				padavine
ZMerno hladno	Sibirija	iglast gozd - tajga	(sl.)sive, zmrznjena	soliflukcija (talijo)
SUBPOLARNO PODNEBJE:	skrajni sever, Sibirija	tundra-mahovi, lišaji, grmičevje	(slabe)tundrske prsti	nomadi,selijo z jeleni-vir hrane