

TROPSKI PAS	<b>Ekvatorialno podnebje</b>	Srednja letna temperatura je 24° do 26°C. Skupna količina padavin 1500mm do 2000mm. Temperature nikoli ne padejo pod 20°C.	Ferasol rdečkaste barve. Naravno rastje je tropski deževni gozd, najdemo nasade čajevca in kavovca.	Gojijo gomoljnice - jam, maniok, batate; proso, riž, koruzo. Za svetovni trg kakavovec(v nižinah) in kavvovec (na pobočjih). Poleg tega ima jo še oljno palmo(mila), kokosova, bananina. Raste tudi kavčukovec. Živinoreje ni zaradi muhe cece.
	<b>Savansko Podnebje</b>	Temperature so visoke 23°-25°C, lahko se spustijo pod 20°C. Količina padavin je 1500mm do 500mm. Značilne so deževne dobe – ena ali dve.	Ferasoli rdeče in rumene barve. Savansko rastje, svetel tropski gozd, pollistopadni gozd.	Gojijo jam, maniok, batate, proso, riž in koruzo. Živinoreja je polnomadska. Za svetovni trg gojijo še čaj, tobak, sladkorni trs, bombaž.
	<b>Tropsko polsuho (savansko) in suho (puščavsko) podnebje</b>	Temperature so od 15 do 20°C. Padavin je v polsuhem od 100mm do 250mm, v suhem do 100mm, v eni deževni dobi.	Rdečkaste puščavske ki prehajajo v sive. Arenosoli-rdečkasta, kserosoli-sivkasta. Rastje so šopi trave, redki grmi	Živinoreja je polnomadska ali nomadska. Poljedelstvo je le če veliko zalivajo. V oazah so datljeve palme.
SUBTROPSKI PAS	<b>Sredozemsko podnebje</b>	Najnižja januarska temperatura je 5°do 10°C, julijske pa od 20°do 25°C+ Padavin je od 500mm do 1000mm v jesensko zimskem času.	Rdeče in rjave-kambisoli, terrarossa. Naravno rastje je zimzelen hrastov gozd, vmes pa cedre in ciprese. Danes je značilna makija.	V evropsko-azijskem sredozemlju še gojijo pšenico. V evropsko-afriškem sredozemlju oljko. Drugod agrume, sadje, vinsko trto, jagodičevje, cvetje. Ovčjerejo in kozje rejo najdemo v polnomadski obl
	<b>Subtropsko polsuho in suho podnebje</b>	Srednja januarska temperatura je od 3 do 6°C, julijska od 30 do 36°C.	Prsti so rjavkaste, rdečkaste in sivkaste. Kastanozjov-rjava prst. Šopi trave, redki grmi	Tradicionalno samo polnomadska in nomadska živinoreja. Poljedelstvo po 2sv z namakanjem. Uspevajo vinska trta, agrumi, sadje, zelenjava, bombaž, žito, riž.
	<b>Subtropsko vlažno-monsunsko podnebje</b>	Srednja zimska temperatura 10-15°C, srednja poletna pa 23-30°C. Letna količina padavin je 1500mm. Nosijo jih pasat – celo leto. Pri monsunskem je padavin 1000mm do 1500mm, zgoščene so na jun, jul, in aug.	Prsti so rdeče rumene-ferasoli. Rastje subtropsko vlažno-zimzelen vlažen subtropski gozd. Monsunsko-riž, bambus, bombaž	Glavna kultura je riž. Gojijo še mnogo zelenjave. Tipična pijača je čaj. V subtropskem vlažnem gojijo bombaž, riž, tobak, govedo, svinje.

ZMERNI PAS	Oceansko podnebje	Srednja zimska temperatura je 0-3°C, poletna 15-18°C. Padavine so razporejene prek celega leta, 600mm do 800mm.	Prsti so kambisoli, rjave gozdne prsti. Naravno rastje je listopadni listnati gozd.	Po prvi agrarni revoluciji kmetijstvo intenzivno in ekstenzivno. Pedijo govedo, svinje, ovce, perutnino. Okoli velikih mest mlečni pas, mlečna govedoreja (več kot pol), sadjarstvo, jagodičevje, zelenjava in cvetje.
	Celinsko podnebje	Temperaturna amplituda je 20do40° padavin je malo, do 600mm. Največ padavin je poleti.	Prsti so černozjomni-črne stepske prsti. Naravna vegetacija je visokotravna stepa.	Od agrarne revolucije koruza, pšenica; če je hladnejše pa ječmen, oves, rž, krompir
	Zmerno hladno podnebje	Januarske temperature okoli -45°C, poletne okoli 15°C. Padavin je do 250mm v zimskem času.	Prst je podzol. To je siva, zelo sprana prst. Naravno rastje je tajga.	V Rusiji gojijo ječmen, oves, rž, krompir.
POLARNI PAS	Tundersko podnebje	Srednje januarske temperature so -15°C, julijske 10°C. Padavin je pod 250mm v zimskem času.	Prsti so glejsoli. So črne barve vendar nerodovitne. Naravno rastje so lišaji, mahovi, pritlikavo drevje in živopisane cvetlice.	Polnomadska živinoreja. V S Ameriki gojijo Karibuje, v Evropi pa severne jelene.
	Podnebje večnega snega in ledu	Temperature so vedno pod 0°C. Padavin skoraj ni.	Ni ničesar.	Ga ni.