



Državni izpitni center



P 1 7 3 S 3 0 1 1 3

ZIMSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE


Petek, 2. februar 2018

POKLICNA MATURA

Moderirana različica

IZPITNA POLA 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ D	
2	1	♦ B	
3	1	♦ A	
4	1	♦ B	
5	1	♦ C	
6	1	♦ A	
7	1	♦ B	
8	1	♦ C	
9	1	♦ A	
10	1	♦ D	
11	1	♦ C	
12	1	♦ B	
13	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
14	1	♦ 2, 4, 3, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ 3, 1, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
16	1	♦ 2, 4, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
17	1	♦ 2, 1, 4, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
18	1	♦ 4, 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
19	1	♦ 3, 2, 4, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
20	1	♦ 3, 4, 2, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
21	1	♦ 4, 1, 3, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
22	1	♦ 3. 4. 1. 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
23	1	♦ 1, 3, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
24	1	dve od:	



♦ arterija na notranji strani nadlahti (arteria brachialis)

♦ arterija v komolcu (arteria brachialis)

♦ arterija v zapestju (arteria radialis)

♦ arterija na zunanji strani zapestja (arteria ulnaris)

25	1	dve od: ♦ kadar je urinska vrečka napolnjena do 2/3 ♦ na vsakih osem ur	
26	1	♦ od 36–37 °C	
27	1	♦ Pogledamo identifikacijsko zapestnico na pacientovi roki.	
28	1	tri od: ♦ kompresijska obveza ♦ neposreden pritisk na krvaveče mesto ♦ pritisk na področno arterijo med krvavečim mestom in srcem ♦ preveza uda z namenskim zažemkom (Eschmarhova preveza)	
29	1	tri od: ♦ hipertenzija ♦ edemi, hiter porast telesne teže ♦ proteinurija ♦ bruhanje ♦ iskrenje pred očmi, motnje vida ♦ bolečine v žlički in pod desnim rebrnim lokom ♦ oligurija ♦ krči ...	
30	1	♦ 0,5 ml zdravila	

Skupno število točk IP 1: 30

IZPITNA POLA 2**1. naloga**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ per os (skozi usta) ♦ po nasogastrični sondi ♦ po nasoduodenalni sondi ♦ po gastrostomi ♦ po jejunostomi 	
1.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ identiteto pacienta ♦ ustreznost hrane (diete) ♦ temperaturo hrane ♦ način hranjenja ♦ stopnjo samooskrbe pacienta ♦ če se hrani pacient v sedečem ali polsedečem položaju ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
1.3	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ koliko poje ♦ kaj poje (katera hrana mu odgovarja) ♦ koliko tekočine popije ♦ ali ima apetit ♦ ali ima težave pri grizenju, žvečenju hrane ♦ ali ima spremenjen okus ♦ ali odklanja/zavrača hrano ♦ ali hrane ne prenaša/bruha ♦ ali so značilne motnje požiranja ♦ ali obstajajo gastrointestinalne težave ♦ kako se počuti med hranjenjem in po njem ♦ subjektivna ocena sitosti (je pacient sit, lačen) ♦ čustveno razpoloženje pacienta (vznemirjenost, žalost, zaspanost) ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri 1 točka.
Skupaj	4		

2. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Splošna anestezija je stanje začasne nezavesti, ki jo neprekinjeno, natančno in skrbno nadzoruje anesteziolog ob uporabi ustreznih aparatov. Pacient ne čuti bolečine in ne zaznava, kaj se z njim dogaja. ♦ Lokalna anestezija je stanje, pri katerem zdravnik vnese anestetik neposredno v operativni predel. Pacient je pri zavesti, med kirurškim posegom v anesteziranem predelu ne čuti bolečine ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.

2.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ hipoksija ♦ prenehanje dihanja ♦ krvavitev iz rane ♦ globoka venska tromboza, tromboflebitis ♦ pljučna embolija ♦ šok ♦ okužba ♦ pljučnica ♦ atonija črevesja, pooperativni ileus ♦ anurija ♦ dehiscenca rane ♦ bruhanje ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
Skupaj	4		


3. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bris nosu ♦ bris žrela ♦ bris pazduhe ♦ bris dimelj ♦ bris perineja ♦ bris rane 	
3.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sepsa ♦ pljučnica ♦ meningitis ♦ vnetje srčnih zaklopk ♦ okužba sečil ♦ septični artritis ♦ septični burzitis ♦ osteomielitis 	
3.3	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ higiena rok (umivanje in razkuževanje rok) ♦ uporaba osebne varovalne opreme: rokavice, predpasnik ali plašč, maska ♦ kontaktna izolacija pacienta ♦ uporabljamo pripomočke za enkratno uporabo ♦ pripomočki za zdravstveno nego (merilnik krvnega tlaka, termometer) se uporabljajo samo za enega pacienta ♦ pripomočke (umivalnik, vrč ...) očistimo in razkužimo takoj po uporabi ♦ redno čistimo in razkužujemo pacientovo okolico, površine in opremo ♦ pripomočke prinašamo v bolniško sobo sproti (ne delamo zalog) ♦ omejimo obiske in obiskovalce poučimo o ukrepih za preprečevanje okužbe ♦ izvajanje dekolonizacije po naročilu zdravnika ♦ upoštevamo pravila za varno odstranjevanje ostrih predmetov v ustrezne zbiralnike ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
Skupaj	4		

4. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	♦ arteria brachialis	
4.2	2	pet od: ♦ Poskrbimo za varnost in ocenimo stanje pacienta. ♦ Dvignemo roko in s prsti pritismo na arterijo brahialis. ♦ Naredimo kompresijsko obvezo (na krvaveče mesto položimo sterilno gazo in trdo zvit povoj, oboje ovijemo s povojem, da se krvavitev zaustavi). ♦ Pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. ♦ Imobiliziramo poškodovano roko (namestimo jo v ruto pestovalnico ali opornico). ♦ Pacienta namestimo na hrbet (mu dvignemo nogi za 30 cm). ♦ Do prihoda reševalcev opazujemo pacienta, mu merimo vitalne funkcije, preverimo uspešnost namestitve kompresijske obveze.	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri 1 točka.
4.3	1	tri od: ♦ barvo uda (bled, pomodrel) ♦ toploto uda (hladna, topla koža) ♦ občutljivost uda (pacienta prosimo, da nas stisne za roko, lahko navaja mravljinčenje) ♦ krvni povratek (primeren, če je manjši od 2 sekund, podaljšan, če je več kot 3 sekunde)	
Skupaj	4		

5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	1	tri od: 	Za 1 točko morajo biti označena tri vbodna mesta, od tega eno v predelu trebuha, eno v predelu stegna in eno v predelu nadlakti.

5.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ čisto ♦ suho ♦ nepoškodovano: brez odrgnin, znakov vnetja, modric, brazgotin ♦ brez izpuščajev ♦ brez zatrdlin ♦ brez kožnih znamenj ♦ brez oteklin ... 	
5.3	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Shranjujemo pri sobni temperaturi. ♦ Ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi. ♦ Ne sme biti v neposredni bližini grelnega telesa. ♦ Shranjujemo ga v hladilniku, vendar ga pred uporabo vzamemo iz hladilnika toliko prej, da doseže sobno temperaturo. ♦ Inzulinski peresnik označimo s pacientovimi podatki. ♦ Inzulinski peresnik shranjujemo brez injekcijske igle. 	
5.4	1	♦ manj od 4 mmol/l	
Skupaj	4		

6. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ razvade: kajenje, čezmerno pitje alkohola, droge ♦ arterijska hipertenzija ♦ bolezn srca ♦ povišana vrednost maščob in holesterola v krvi ♦ sladkorna bolezen ♦ debelost ♦ telesna in duševna nedejavnost ♦ stres ♦ starost, spol ♦ dednost ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
6.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Izberemo ustrezen pripomoček za inkontinenco. ♦ Izvajamo poostreno anogenitalno nego. ♦ Kožo v anogenitalnem predelu zaščitimo s primerno kremo. ♦ Opazujemo stanje kože v anogenitalnem predelu. ♦ Opazujemo izločanje in izločke. ♦ Merimo bilanco tekočin. ♦ Pacientu damo psihično podporo. ♦ Dokumentiramo opažanja pri izločanju in odvajanju, posebnosti in izvedene intervencije zdravstvene nege ... 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	4		

7. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opravljamo stalen nadzor in varovanje otroka: nikoli ga ne puščamo samega na tehničnici, previjalni mizi v vozičku ... ♦ Vedno zapremo ograjico otroške posteljice. ♦ Poskrbimo, da ima otrok nedersečo in varno obutev. ♦ Poskrbimo, da ima otrok oblačila primerne dolžine in velikosti. ♦ Zavarujemo dostop do stopnišča (varnostna ograjica). ♦ Tla naj bodo suha, nederseča, brez ležečih predmetov po tleh, navlake. ♦ Otroka ne pustimo samega pri odprtem oknu, okna zapremo z varnostnim zapiralom. ♦ Preprečujemo padce pri kopanju z nadzorom in pripomočki (nederseča podloga, varnostni stolček ...). ♦ V vozičku otroka pripnemo z varnostnim pasom, v mirovanju morajo biti zavore vozička zavrte. ♦ Pri vožnji otroka vedno pripnemo z varnostnim pasom v avtomobilskem varnostnem sedežu ... 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
7.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ utopitev ♦ opekline, oparine ♦ zadušitev ♦ zastrupitev ♦ poškodba z električnim tokom ♦ prometne nesreče ... 	
Skupaj	3		

8. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pekoča bolečina v žrelu in pri požiranju ♦ pordelo žrelo, gnojne obloge ♦ vročina ♦ povečane in boleče vratne bezgavke ♦ glavobol ♦ bruhanje, slabost ♦ bolečina v ušesih ali trebuhu 	
8.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ dajanje zdravil po naročilu zdravnika (antibiotiki) ♦ zniževanje povišane telesne temperature ♦ zadosten vnos tekočine, topli napitki ♦ lahko prebavljiva, vitaminsko in kalorično bogata ter mehka hrana ♦ otroka hranimo strpno in počasi ♦ merjenje vitalnih funkcij ♦ počitek in mirovanje otroka ♦ higiena rok in ustne votline pri otroku ... 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	3		

Skupno število točk IP 2: 30