

MLEČNI ZOBJE	VRSTNI RED RASTI	STAROST OTROKA (meseči)
prvi sekalec	1	6 - 8 mesecev
drugi sekalec	2	8- 12 mesecev
podočnik	4	16 - 20 mesecev
prvi kočnik	3	12 - 18 mesecev
drugi kočnik	5	20 - 30 mesecev

STALNI ZOBJE	VRSTNI RED RASTI	STAROST OTROKA (leta)
prvi sekalec	2	6 - 8 let
drugi sekalec	3	7 - 9 let
podočnik	5	9 - 13 let
prvi ličnik	4	9 - 12 let
drugi ličnik	6	10 - 14 let
prvi kočnik	1	5 - 8 let
drugi kočnik	7	10 - 14 let
tretji kočnik (modrostni zob)	8	10 - 40 let

STAROST	CEPLJENJE
*1. mesec	tuberkuloza
3. mesec	*DI-TE-PER POLIO Hib I.
4. - 5. mesec	DI-TE-PER POLIO Hib II.
6. mesec	DI-TE-PER POLIO Hib III.
12. mesec	*MPR
18. mesec	DI-TE-PER POLIO Hib
5. - 6. let	MPR, Hb I., Hb II. (čez en mesec)
1. razred	*Hb III.
3. razred	*DI-TE
3. letnik	tetanus

*v primeru da otrok izhaja iz dežele, kjer je tuberkuloza, ali je v družini tuberkuloza prisotna, ali bo otrok odpotoval v dežele, kjer je nevarnost okužbe s tuberkulozo

***DI-TE-PER POLIO Hib** = davica - tetanus - oslovski kašelj otroška paraliza influenza tipa B

***MPR** = mumps, ošpice, rdečke

***Hb** = hepatitis B

***DI-TE** = davica, tetanus, oslovski kašelj